

ENGLISH TRANSLATION

zglaszanej authors publications:

Szopiński J., S. Dąbrowiecki

Title zglaszanej publications:

”Information about the multicenter clinical study Desarda vs. Lichtenstein”

a summary of publication:

In April 2005 r. rozpoczęto multicentre, randomized clinical examination, double-blind comparison of methods: Desardy and Lichtenstein to repair przepuklin flank. The study included a 6 surgical centers, Bydgoszcz, Torun, Poznan, Slupska, Plock and Lodz. The research is eligible men over 18 years of age, to make themselves known to comply with the original operation scheduled przepukliny flank. The study is to compare both the first period after an operation (complications of early symptoms, back to normal life) and the late - late complications (relapses, chronic pain).

The study used an Internet database and plans to use advanced software to collect and analyse data and information exchange between centres.

For 1.09.2005 laying zrandomizowano 28 patients. There has been a common and benign Post-operative complications in both groups of patients. Nor was przepukliny early relapse. Planned enlargement of the number of centres investigators.

29.

imie i nazwisko osoby prezentujacej: Jacek Szopiński

stopien naukowy: lek.med.

miejsce pracy:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UMK

ulica: M.Skłodowskiej-Curie 9

miescowosc: Bydgoszcz

e-mail: jacek.szopinski@wp.pl

autorzy zglaszanej publikacji:

Szopiński J., Dąbrowiecki S.

tytul zglaszanej publikacji:

Informacja o wieloośrodkowym badaniu klinicznym Desarda vs Lichtenstein

streszczenie publikacji:

W kwietniu 2005 r. rozpoczęto wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne metodą podwójnie ślepej próby porównujące metody: Desardy i Lichtensteina w naprawie przepuklin pachwiny. Do badania włączyło się 6 ośrodków chirurgicznych z Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Słupska, Płocka i Łodzi. Do badania kwalifikuje się mężczyzn, powyżej 18 roku życia, zgłaszających się celem wykonania planowej operacji pierwotnej przepukliny pachwiny. Badanie ma na celu porównanie zarówno pierwszego okresu pooperacyjnego (powikłania wczesne, dolegliwości, powrót do normalnej aktywności życiowej) jak i okresu późnego - powikłania późne (nawroty, przewlekłe dolegliwości bólowe).

W badaniu wykorzystuje się internetową bazę danych oraz planuje się wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania do zbierania i analizy danych oraz wymiany informacji

między ośrodkami.

Do 1.09.2005 r. zrandomizowano 28 chorych. Zaobserwowano typowe i niegroźne powikłania pooperacyjne w obu grupach chorych. Nie stwierdzono nawrotu wczesnego przepukliny.

Planuje się powiększenie liczby ośrodków prowadzących badanie.